Witch Flounder (Divs. 4RST)

Background

Witch flounder are found in the deeper waters of the North Atlantic. In the Northwest Atlantic, witch range from the lower Labrador coast to Cape Hatteras, North Carolina. Relative to other flounders, witch are slow-growing and long-lived. Spawning occurs from spring to late summer, depending on the region, and in the Gulf of St. Lawrence (NAFO Division 4RST), spawners aggregate in channel waters in January and February. Spawning in the Gulf is believed to occur in deep water in late spring or early summer. The females are highly fertile, releasing as many as 500,000 eggs in a single spawn. In the late 1970s and early 1980s, 50% of females reached maturity at lengths of 40-45 cm (9-14 years of age) and 50% of males matured at lengths of 30-34 cm (5-8 years of age, Bowering and Brodie 1984). The fertilized eggs float and hatching occurs after several days, followed by a lengthy pelagic stage that may last a year. Juveniles eventually settle to the bottom in deep waters. In northern areas of their range, including the Gulf of St. Lawrence, witch flounder move into deep water during winter months and cease feeding. Witch grow faster in the Gulf of Maine and Georges Bank, where water temperature is higher and feeding occurs year-round.

Commercial fisheries for witch flounder developed significantly with the introduction of otter trawling to Newfoundland in the 1940s. Stocks in the Gulf of St. Lawrence became exploited in the 1950s when declining stocks caused Danish seiners in Fortune Bay, Newfoundland (NAFO Division 3Ps) to move to St. George's Bay in 4R. A small directed fishery for witch developed in St. George's Bay during the summertime, with offshore, winter catches of witch gaining in importance as bycatch in cod- and redfish-directed fisheries. The witch fishery expanded in the Gulf from St. George's Bay during the 1970s to the Esquiman Channel and the northern shores of Cape Breton Island.

Witch flounder in the northern Gulf of St. Lawrence (NAFO Division 4RS) came under quota management in 1977, with a precautionary quota of 3500 t. The first detailed assessment of 4RS witch was conducted in 1978 and continued yearly until 1981. During the 1980s, 4T landings increasingly dominated Gulf witch landings; however, the management unit remained as 4RS. In 1979, the TAC on 4RS was increased to 5000 t to remove an old and slow-growing component of the stock. This measure succeeded in reducing the age composition of the stock; however, landings declined and by 1982, the TAC was reduced to 3500 t. Stock assessments resumed in 1991 and following the recommendation of the Fisheries Resource Conservation Council in 1994, the management unit was extended to 4RST in 1995.



Summary

- In 2000, the TAC increased from 800 to 1000 t. Seine fleets directing for witch flounder in 4R and 4T both caught their quotas in 2000.
- The research vessel survey biomass index for commercial sizes (30+ cm) was low from 1993 to 1998, but increased in 1999 and remained at the same relatively high level in 2000.
- The biomass increase in 1999 was restricted to eastern 4T but increases in the other areas of the Gulf contributed to the 2000 value.
- Sentinel surveys of the northern Gulf (primarily 4R and 4S) indicate that biomass in this area changed little from 1995 to 1999. The October sentinel survey indicated an increase in biomass in 2000 but the July survey did not.
- A strong year-class, likely 1995, has been observed in the research vessel survey of the northern Gulf each year since 1997 and should soon contribute to the fishery.
- Stock structure is a major source of uncertainty for this resource.

The Fishery

Landings and TAC's (thousand tonnes)

Year	Average 1982-89	Average 1990-93	Average 1994-97	1998	1999	2000*
TAC	3.5	3.5	1.0	0.8	0.8	1.0
Landing	1.8	1.0	0.5	0.9	0.7	1.0

*Preliminary statistics

Landings of witch flounder in NAFO Divs. 4RST exceeded 3000 t in most years from 1960 to 1980. Landings declined to near 1000 t in the early 1980s but increased to levels near 2500 t in the late 1980s. Landings declined in the 1990s, reaching very low levels in 1994 to 1997 but increasing to the TAC in 1998 to 2000. The decline in the 1994-1997 period reflected very low landings from 4R during this period.

Landings (000s of tonnes)



Throughout the 1990s and most of the 1980s landings have been mostly by seiners directing for witch flounder between May and October in St. George's Bay, Newfoundland (4Rd) and off the west coast of Cape Breton Island (4Tf and 4Tg). The drop in landings in the 4R area in 1994-1997 reflected a sharp decline in fishing effort in this area. In this period, a high incidence of crab gear interfered with the fishery for witch flounder in 4R in early summer, a period when fishing effort was traditionally high. Fishing effort in 4R increased again in 1998, as did the landings. The seine fleet in 4R has caught its quota each year since 1998.

Directed Effort (days)



(data unavailable for 4R in 2000)

Since the mid 1990s, the fishery for witch flounder in 4T has opened later than has been traditional. This has prevented fishing during periods when catch rates have traditionally been high as the witch flounder move into the Cape Breton Trough in spring. Nonetheless, the fleet directing for witch flounder in 4T has caught its quota each year since 1998.

Resource Status

A biomass index for witch flounder over the entire 4RST area is calculated by combining data from annual **research vessel surveys** conducted in the southern Gulf each September and in the northern Gulf each August. This index (the catch per tow expanded to the area surveyed) should reflect changes in witch flounder biomass over time but should not be taken as a measure of the actual biomass present in the area. A sharp decline in biomass occurred from 1990 to 1993. The index of biomass remained at a low but steady level from 1993 to 1998. It increased in 1999 and remained at this relatively high level in 2000.

104-00646/

Survey biomass index



Changes in biomass have not occurred uniformly throughout the stock area. The biomass index declined in 4R, 4S and western 4T but not in eastern 4T. In recent years, biomass has been relatively high in eastern 4T, but has remained very low in 4S and western 4T. The large increase in the biomass index in 1999 was confined to eastern 4T. However, increases in the survey catch rates in 4R, 4S and western 4T also contributed to the relatively high biomass index in 2000.

Survey biomass index (30+ cm) by area



Catch rates of witch flounder in the research surveys in 2000 were high in the Cape Breton Trough. Catch rates also tended to be relatively high in the estuary of the St. Lawrence River, along the southern slope of the Laurentian Channel, in St. George's Bay, and along the eastern slope of the Esquiman Channel.

Catches of witch flounder in standard tows of the 2000 research vessel surveys.



Pre-recruit abundance in the surveys fluctuated without trend between 1990 and 1999 but increased markedly in 2000. Pre-recruit abundance has tended to be higher in the 1990s than the estimates for the late 1980s. However, the trawl used in the August survey changed in 1990 to one that is more efficient at catching small witch flounder. Adjustments for this change in efficiency have been included in these analyses based on the results of comparative fishing experiments but it is possible that these adjustments have not been entirely effective. Moreover, the time series of pre-recruit abundance is short, and it is unknown how recent values compare to the longterm average.

Survey mean number/tow



The August research survey of the northern Gulf indicates that a strong year-class should soon be contributing to the fishery. This year class (probably the 1995 year-class) has

been evident as a mode appearing at progessively larger sizes in the survey each year since 1997. Catches of this year-class were widespread throughout the Laurentian and Esquiman Channels in the 2000 survey.

Length composition (mean number / tow) of witch flounder catches in the August research survey of the northern Gulf



Sentinel surveys conducted in the northern Gulf of St. Lawrence each July and October also provide information on relative abundance over much of the management unit, though they do not cover the Cape Breton Trough area nor the Estuary west of about 67°W, areas where research vessel catch rates are often high. Witch flounder distribution in the October 2000 sentinel survey was comparable to that in the August RV survey of the northern Gulf, with highest catches of witch flounder in St. George's Bay, and along the eastern slope of the Esquiman Channel and the southern slope of the Laurentian Channel.

Catches of witch flounder in the October 2000 sentinel survey



Catch rates in the July sentinel surveys suggest little change in witch flounder biomass in the northern Gulf between 1995 and 2000. The high catch rate in the 1997 survey is due to a single tow. The increase in biomass suggested by including this tow in the index is not supported by the mean catch rates in subsequent years.

Catch rates (kg/tow, ±1SE) of witch flounder in the July sentinel surveys of the northern Gulf of St. Lawrence.



Catch rates in the October sentinel survey indicate no change in biomass from 1995 to 1998. The catch rate in the 1999 survey declined slightly whereas the catch rate increased in 2000. The biomass trend suggested by the October surveys agrees well with the research survey biomass index for commercial-sized (30+ cm) witch flounder in 4R, 4S and western 4T (4RSTw).



Sources of Uncertainty

Stock structure is a major source of uncertainty for this resource, affecting the interpretation of the regional differences observed in biomass trends in the Gulf. Biomass declines in the early 1990s were restricted to 4R, 4S and western 4T. Survey catch rates in eastern 4T (primarily in the Cape Breton Trough) have tended to be high since the mid 1990s. If witch flounder comprise a single stock over the 4RST area, these high catch rates in the Cape Breton Trough reflect a shift in distribution, with an increased proportion of the stock concentrated in this part of their range. On the other hand, witch flounder in the Cape Breton Trough may be linked to those in the 4VW area. A number of exceptionally strong year-classes have been produced on the Scotian Shelf in the 1990s (DFO, 1999), perhaps contributing to the increase in abundance of larger witch flounder in the Cape Breton Trough.

The possibility that changes in catchability may contribute to the large increase in the survey biomass index for eastern 4T in 1999 and for the northern Gulf in 2000 cannot yet be discounted. Contradictory results between the July and October sentinel surveys in 2000, with the biomass index increasing in the October survey but not in the July survey, are an additional source of uncertainty.

The apparent increase in pre-recruit abundance in the 1990s relative to the late 1980s is uncertain because the trawl used in the northern Gulf survey changed in 1990. Adjustments for the differences in fishing efficiency between the trawls used before and since 1990 may not have been entirely effective.

Outlook

The biomass of witch flounder over the entire 4RST area increased in 1999 and remained at a relatively high level in 2000. While the increase in 1999 was restricted to eastern 4T, increases in the other areas of the Gulf contributed to the high 2000 value. A strong year-class, likely the 1995 year-class, has been observed in the northern Gulf survey each year since 1997. This year-class should soon be contributing to the fishery. If these trends persist, the witch flounder resource in 4RST should continue to improve, not withstanding the question of stock structure.

For More Information

Contact: Douglas Swain
Marine Fish Division
Gulf Fisheries Centre
P.O. Box 5030, Moncton
New Brunswick, E1C 9B6

TEL: (506) 851 6237
FAX: (506) 851 2620
E-Mail: swaind@dfo-mpo.gc.ca

References

Bowering, W.R., and W.B. Brodie. 1984. Distribution of witch flounder in the northern Gulf of St. Lawrence and changes in its growth and maturity patterns. North Am. J. Fish. Manag. 4: 399-413.

DFO, 1998. 4RST witch flounder (*Glyptocephalus cynoglossus*). DFO Science Stock Status Report A3-20 (1998).

DFO, 1999. Updates on selected Scotian Shelf groundfish stocks in 1999. DFO Sci. Stock Status Report A3-35 (1999).

DFO, 2000. Updates on selected Gulf of St. Lawrence Groundfish Stocks in 2000. DFO Sci. Stock Status Report A3-36 (2000).

Poirier, G.A., G.A. Chouinard, D.P. Swain, T. Hurlbut, C. LeBlanc, and R. Morin. 2000. Preliminary results from the September 2000 groundfish survey of the Southern Gulf of St. Lawrence/Résultats préliminaires du relevé de septembre 2000 sur les poissons de fond dans le sud du golfe du Saint-Laurent. DFO Can. Stock Assess. Sec. Res. Doc. 2000/135.

Swain, D.P., and G.A. Poirier. 2001. Status of witch flounder in NAFO Divisions 4RST, February 2001. DFO Can. Stock Assess. Sec. Res. Doc. 2001/021.

This report is available from the:

Maritime Provinces
Regional Advisory Process
Department of Fisheries and Oceans
P.O. Box 1006, Stn. B203
Dartmouth, Nova Scotia
Canada B2Y 4A2
Phone number: 902-426-7070
e-mail address: myrav@mar.dfo-mpo.gc.ca

Internet address: www.dfo-mpo.gc.ca/csas
ISSN: 1480-4913

La version française est disponible à l'adresse ci-dessus.

Correct citation for this publication

DFO, 2001. Witch Flounder (Divs. 4RST). DFO Science Stock Status Report A3-20 (2001).

Plie grise (div. 4RST)

Renseignements de base

La plie grise est présente dans les eaux profondes de l'Atlantique Nord. Dans l'Atlantique Nord-Ouest, on la trouve depuis la basse côte du Labrador jusqu'au cap Hatteras, en Caroline du Nord. Comparativement à d'autres poissons plats, la plie grise a une croissance lente et une grande longévité. Elle fraye du printemps à la fin de l'été, selon la région. Dans le golfe du Saint-Laurent (divisions 4RST de l'OPANO), les frayeurs se rassemblent dans les eaux du chenal en janvier et février. On croit que la fraye se produit dans le Golfe en eaux profondes à la fin du printemps ou au début de l'été. Les femelles sont très fertiles et pondent jusqu'à 500 000 oeufs en une seule fraye. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, 50 % des femelles atteignaient la maturité à des longueurs de 40-45 cm (9-14 ans) et 50 % des mâles à des longueurs de 30-34 cm (5-8 ans, Bowering and Brodie 1984). Les oeufs fécondés flottent et viennent à éclosion au bout de plusieurs jours, après quoi survient un long stade pélagique, qui peut durer un an. Les juvéniles finissent par se fixer au fond des eaux profondes. Dans la partie nord de son aire de distribution, y compris dans le golfe du Saint-Laurent, la plie grise migre vers les eaux profondes durant l'hiver et cesse alors de se nourrir. Elle croît plus rapidement dans le golfe du Maine et sur le banc Georges, où la température de l'eau est plus élevée et où elle se nourrit à longueur d'année.

La pêche commerciale de la plie grise s'est considérablement développée avec l'introduction du chalut à panneaux à Terre-Neuve dans les années 1940. Les stocks du golfe du Saint-Laurent ont commencé à être exploités dans les années 1950, à l'époque où une baisse des stocks de la baie de Fortune, à Terre-Neuve (division 3Ps de l'OPANO), a poussé les senneurs de cette région à aller pêcher dans la baie St. Georges (division 4R). Une pêche sélective de la plie grise se développa dans la baie St. Georges l'été, tandis que l'hiver les prises accessoires de plie grise dans les pêches sélectives hauturières de morue et de sébaste s'accrurent. Dans les années 1970, la pêche de la plie grise dans la baie St. Georges s'étendit au Golfe, jusqu'au chenal Esquiman et à la côte nord de l'île du Cap-Breton.

La pêche de la plie grise dans le nord du golfe du Saint-Laurent (divisions 4RS de l'OPANO) a été assujettie à un quota préventif de 3 500 t en 1977. La première évaluation détaillée du stock de 4RS a été réalisée en 1978; elle a été renouvelée chaque année jusqu'en 1981. Dans les années 1980, les prises de 4T ont de plus en plus dominé les débarquements de plie grise du Golfe, mais l'unité de gestion 4RS a été maintenue. En 1979, le TAC de 4RS a été augmenté à 5 000 t pour permettre le retrait d'une vieille composante du stock, à croissance lente. Cette mesure a eu pour effet de réduire la composition du stock selon l'âge; toutefois, les débarquements chutèrent pas la suite et, en 1982, le TAC fut ramené à 3 500 t. Les évaluations du stock reprirent en 1991 et, à la recommandation formulée en 1994 par le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques, l'unité de gestion fut étendue à 4RST en 1995.



Sommaire

- En 2000, le TAC a augmenté, passant de 800 à 1 000 t. Les flottilles de senneurs de 4R et de 4T qui pratiquaient la pêche sélective de la plie grise ont toutes deux capturé leur quota.
- L'indice de biomasse des plies grises de taille commerciale (30+ cm) d'après le relevé par navire scientifique a été faible de 1993 à 1998, mais il a augmenté en 1999 pour atteindre un niveau relativement élevé, auquel il s'est maintenu en 2000.
- L'accroissement de la biomasse en 1999 s'est limité à l'est de 4T, mais des hausses dans d'autres secteurs du Golfe ont contribué au chiffre de biomasse de 2000.
- Il ressort des relevés sentinelles pratiqués dans le nord du Golfe (essentiellement dans 4R et dans 4S) que la biomasse dans cette région a peu changé de 1995 à 1999. Le relevé sentinelle d'octobre dénote une augmentation de la biomasse en 2000, ce qui n'est pas le cas de celui de juillet.
- Une forte classe d'âge, vraisemblablement celle de 1995, a été observée dans le relevé par navire scientifique au nord du Golfe chaque année depuis 1997; elle devrait bientôt contribuer à la pêche.
- La structure du stock est une grande source d'incertitude en ce qui concerne cette ressource.

La pêche

Débarquements et TAC (milliers de tonnes)

Année	Moy. 1982-89	Moy. 1990-93	Moy. 1994-97	1998	1999	2000*
TAC	3,5	3,5	1,0	0,8	0,8	1,0
Débar-quements	1,8	1,0	0,5	0,9	0,7	1,0

* Statistiques préliminaires

Les **débarquements** de plie grise dans les divisions 4RST de l'OPANO ont dépassé les 3 000 t la plupart des années de 1960 à 1980. Les débarquements sont tombés alentour de 1 000 t au début des années 1980, mais ils ont augmenté pour atteindre des niveaux proches de 2 500 t à la fin des années 1980. Les débarquements ont ensuite diminué dans les années 1990, descendant à de très bas niveaux de 1994 à 1997; ils sont remontés au niveau du TAC de 1998 à 2000. Le déclin observé de 1994 à 1997 reflétait les très faibles débarquements en provenance de 4R durant cette période.

Débarquements (000 tonnes)



Durant toutes les années 1990 et la plupart des années 1980, les débarquements sont provenus surtout des senneurs qui pratiquaient la pêche sélective de la plie grise entre mai et octobre dans la baie St. George, à Terre-Neuve (4Rd) et au large de la côte ouest de l'île du Cap-Breton (4Tf et 4Tg). La chute des débarquements dans la division 4R survenue de 1994 à 1997 était due à une nette diminution de l'effort de pêche dans cette division. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de cas d'interférence des engins de pêche du crabe avec la pêche de la plie grise dans 4R au début de l'été, saison où l'effort de pêche était traditionnellement élevé. L'effort de pêche dans 4R a augmenté à nouveau en 1998, tout comme les débarquements. La flottille de senneurs de 4R a capturé son quota chaque année depuis 1998.

Effort de pêche sélective (jours)



(données non disponibles pour 4R en 2000)

Depuis le milieu des années 1990, la pêche de la plie grise dans 4T ouvre plus tard que par le passé. Cela a empêché les captures à des périodes où les taux de prises ont été traditionnellement élevés, la plie grise migrant dans la dépression du Cap-Breton au printemps. La flottille qui pratique la pêche sélective de la plie grise dans 4T a néanmoins capturé son quota chaque année depuis 1998.

État de la ressource

On a établi un indice de biomasse de la plie grise dans toute la zone 4RST, en combinant les données du **relevé annuel par navire scientifique** effectué dans le sud du Golfe tous les mois de septembre et dans le nord du Golfe tous les mois d'août. Cet indice (prises par trait, appliquées à toute la zone de relevé) devrait refléter les changements dans la biomasse de plie grise au fil du

temps, mais il ne devrait pas être considéré comme une mesure de la biomasse réelle présente dans la zone. La biomasse a brusquement chuté de 1990 à 1993. L'indice de biomasse s'est stabilisé à un faible niveau de 1993 à 1998. Il a augmenté en 1999 et est demeuré à ce niveau relativement haut en 2000.

Indice de biomasse d'après le relevé



Les changements dans la biomasse n'ont pas été uniformes dans toute la zone de stock. L'indice de biomasse a diminué dans 4R, dans 4S et dans l'ouest de 4T, mais non dans l'est de 4T. Ces dernières années, la biomasse a été relativement haute dans l'est de 4T, mais elle est restée très basse dans 4S et dans l'ouest de 4T. La forte augmentation de l'indice de la biomasse enregistrée en 1999 se limitait à l'est de 4T. Toutefois, des augmentations des taux de prises du relevé dans 4R, 4S et l'ouest de 4T ont aussi contribué à l'indice de biomasse relativement élevé en 2000.

Indice de biomasse (30+ cm) par secteur d'après le relevé



Les taux de prises de plie grise dans les relevés par navire scientifique en 2000 étaient élevés dans la dépression du Cap-Breton. Ils tendaient aussi à être relativement hauts dans l'estuaire du Saint-Laurent, le long du talus sud du chenal Laurentien, dans la baie St. George et le long du talus est du chenal Esquiman.

Prises de plie grise dans les traits standard des relevés par navire scientifique en 2000



L'**abondance des prérecrues** dans les relevés a fluctué, sans présenter de tendance, entre 1990 et 1999, mais elle a nettement augmenté en 2000. Dans les années 1990, l'abondance des prérecrues a eu tendance à être plus élevée que les estimations de la fin des années 1980. Toutefois, le chalut utilisé dans le relevé d'août a été abandonné en 1990 au profit d'un chalut plus efficace pour la capture des petites plies grises. Des corrections fondées sur les résultats d'expériences comparatives de pêche ont été apportées aux analyses pour tenir compte de

ce changement dans l'efficacité, mais il se peut qu'elles ne soient pas tout à fait adéquates. De plus, la série chronologique sur l'abondance des prérecrues est courte et on ne sait pas dans quelle mesure les valeurs récentes se comparent bien à la moyenne à long terme.

Nombre moyen/trait dans le relevé



Le relevé scientifique réalisé en août dans le nord du Golfe indique qu'une forte classe d'âge devrait bientôt contribuer à la pêche. Cette classe d'âge (probablement celle de 1995) s'est manifestée de manière évidente dans la composition modale, se présentant sous des tailles de plus en plus grandes dans le relevé chaque année depuis 1997. Les prises parmi cette classe d'âge étaient répandues dans l'ensemble du chenal Laurentien et du chenal Esquiman lors du relevé de 2000.

Composition des prises de plie grise selon la longueur (nombre moyen/trait) dans le relevé scientifique réalisé en août dans le nord du Golfe



Les **relevés sentinelles** effectués dans le nord du golfe du Saint-Laurent tous les ans en juillet en en octobre fournissent aussi des renseignements sur l'abondance relative dans une bonne partie de l'unité de gestion, bien qu'ils ne couvrent pas la région de la dépression du Cap-Breton, ni l'estuaire à l'ouest d'environ 67 °O, secteurs où les taux de prises des navires scientifiques sont souvent élevés. La distribution de la plie grise dans le relevé sentinelle d'octobre 2000 était comparable à celle qui avait été observée dans le relevé par navire scientifique effectué en août dans le nord du Golfe, les plus fortes prises de plie grise provenant de la baie St. George, du talus est du chenal Esquiman et du talus sud du chenal Laurentien.

Prises de plie grise dans le relevé sentinelle d'octobre 2000



Les taux de prises des relevés sentinelles de juillet ne semblent pas révéler beaucoup de changement dans la biomasse de plie grise du nord du Golfe entre 1995 et 2000. Le fort taux de prises enregistré dans le relevé de 1997 est dû à un trait en particulier. L'augmentation de biomasse obtenue en incluant ce trait dans l'indice n'est pas corroborée par les taux de prises moyens des années subséquentes.

Taux de prises (kg/trait, ±1 erreur-type) de plie grise des relevés sentinelles de juillet dans le nord du golfe du Saint-Laurent



Les taux de prises du relevé sentinelle d'octobre ne dénotent pas de changements dans la biomasse de 1995 à 1998. Les taux de prises du relevé de 1999 ont diminué légèrement, alors que ceux de 2000 ont augmenté. La tendance de la biomasse se dégageant des relevés d'octobre concorde bien avec l'indice de biomasse des plies grises de taille commerciale (30+ cm) du relevé scientifique dans 4R, dans 4S et dans l'ouest de 4T (4RSTw).

Taux de prises dans les relevés (kg/trait, ±1 erreur-type)



Sources d'incertitude

La **structure du stock** est une grande source d'incertitude en ce qui concerne cette ressource. Elle se répercute sur l'interprétation des différences régionales observées dans les tendances de la biomasse dans le Golfe. Les reculs de la biomasse du début des années 1990 étaient limités à 4R, 4S et l'ouest de 4T. Les taux de prises du relevé dans l'est de 4T (essentiellement dans la dépression du Cap-Breton) ont eu tendance à être élevés depuis le milieu des années 1990. Si la plie grise provient d'un stock unique dans toute la zone 4RST, ces forts taux de prises dans la dépression du Cap-Breton reflètent un changement dans la distribution, une plus forte proportion du stock étant concentrée dans cette partie de l'aire de distribution. D'un autre côté, la plie grise de la dépression du Cap-Breton est peut-être associée à celle des divisions 4VW. Un certain nombre de classes d'âge exceptionnellement fortes sont apparues sur le plateau néo-écossais dans les années 1990 (MPO, 1999), contribuant peut-être à la hausse de l'abondance des grandes plies grises dans la dépression du Cap-Breton.

On ne peut encore écarter la possibilité que des changements dans le potentiel de capture aient pu contribuer à la forte augmentation de l'indice de biomasse observée dans l'est de 4T lors du relevé de 1999 et dans le nord du Golfe en 2000. Des résultats contradictoires entre les relevés sentinelles de juillet et d'octobre 2000 (l'indice de biomasse était en hausse dans le relevé d'octobre, mais non dans celui de juillet) ajoutent à l'incertitude.

La hausse apparente de l'abondance des prérecrues dans les années 1990 par rapport à la fin des années 1980 soulève aussi des incertitudes, car le chalut ayant servi au relevé dans le nord du Golfe a été changé en 1990. Les corrections apportées pour tenir compte des différences d'efficacité entre le chalut utilisé avant 1990 et celui utilisé après 1990 n'étaient peut-être pas tout à fait adéquates.

Perspectives

La biomasse de plie grise dans toute la zone 4RST a augmenté en 1999 et est restée relativement haute en 2000. Tandis que la hausse observée en 1999 était limitée à l'est de 4T, des augmentations dans d'autres secteurs du Golfe ont contribué à la forte valeur enregistrée en 2000. Une forte classe d'âge, vraisemblablement celle de 1995, a été observée chaque année depuis 1997 lors du relevé réalisé dans le nord du Golfe. Cette classe d'âge devrait bientôt contribuer à la pêche. Si ces tendances se maintiennent, la population de plie grise de 4RST devrait continuer de s'améliorer, indépendamment de la question de la structure du stock.

Pour obtenir de plus amples renseignements,

communiquer avec : Douglas Swain
Division des poissons de mer
Centre des pêches du Golfe
C.P. 5030, Moncton
(Nouveau-Brunswick)
E1C 9B6

TÉL. : (506) 851-6237
FAX : (506) 851-2620
Courriel : swaind@dfo-mpo.gc.ca

Références

Bowering, W.R., and W.B. Brodie. 1984. Distribution of witch flounder in the northern Gulf of St. Lawrence and changes in its growth and maturity patterns. North Am. J. Fish. Manag. 4: 399-413.

MPO, 1998. Plie grise (*Glyptocephalus cynoglossus*) de 4RST. MPO – Sciences, Rapport sur l'état des stocks A3-20 (1998).

MPO, 1999. Mises à jour de l'état de certains stocks de poisson de fond du plateau néo-écossais (1999). MPO – Sciences, Rapport sur l'état des stocks A3-35 (1999).

MPO, 2000. Mises à jour de l'état de certains stocks de poisson de fond du golfe du Saint-Laurent (2000). MPO – Sciences, Rapport sur l'état des stocks A3-36 (2000).

Poirier, G.A., G.A. Chouinard, D.P. Swain, T. Hurlbut, C. LeBlanc et R. Morin. 2000. Preliminary results from the September 2000 groundfish survey of the Southern Gulf of St. Lawrence/Résultats préliminaires du relevé de septembre

2000 sur les poissons de fond dans le sud du golfe du Saint-Laurent. MPO, Secr. can. éval. stocks, doc. rech. 2000/135.

Swain, D.P., and G.A. Poirier. 2001. Status of witch flounder in NAFO Divisions 4RST, February 2001. MPO, Secr. can. éval. stocks, doc. rech. 2001/021.

Distribué par le :

Bureau du processus consultatif régional des provinces Maritimes
Ministère des Pêches et des Océans
C.P. 1006, Succ. B203
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Canada B2Y 4A2
Téléphone : 902-426-7070
Courriel : myrav@mar.dfo-mpo.gc.ca

Adresse Internet : www.dfo-mpo.gc.ca/csas
ISSN : 1480-4921

An English version is available on request at the above address.

La présente publication doit être citée comme suit :

MPO, 2001. Plie grise (div. 4RST). MPO – Sciences, Rapport sur l'état des stocks A3-20 (2001).